

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.

C. C. P. : DIJON 5.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

18 F

Bulletin n° 44 - MAI 1964

6 MAI 1964

VIGNE

ARAIGNEES ROUGES : Les éclosions sont constatées depuis quelques jours. Des parcelles fortement attaquées à l'automne, et non traitées, présentent actuellement des populations très nombreuses d'araignées rouges (Metatetranychus ulmi), notamment dans la Côte des blancs (Meursault, Puligny), dans le Maconnais (Chaintré) et en Beaujolais (Romanèche-Thorins).

Effectuer le traitement à l'aide de produits systémiques, ou à l'aide d'acaricides de contact. Consulter la liste des spécialités envoyée en début de saison.

N.B. : Il est trop tôt pour utiliser un "ovicide".

ACARIOSE - ERINOSE : Le traitement signalé ci-dessus est efficace contre ces parasites. L'utilisation du soufre en poudrage contre l'érinose n'est recommandée que si la température est suffisante pour son action.

BRENNER ou ROUGEOT PARASITAIRE : Dans les parcelles où la maladie s'est manifestée l'an dernier, effectuer un traitement précoce en pulvérisation quand la vigne présente au minimum trois feuilles étalées.

Le choix du produit à utiliser s'effectue parmi les produits cupriques, organo-cupriques, le zinèbe et le phaltane, à la dose préconisée contre le mildiou.

ARBRES FRUITIERS

OIDIUM DU POMMIER : Les attaques s'avèrent cette année très importantes, il est donc nécessaire d'être vigilant. Se reporter à notre note du 13 Avril.

ANTHRACNOSE DU CERISIER : Sur les variétés sensibles à la maladie, il est conseillé d'effectuer un traitement à l'aide d'un produit organique de synthèse.

BETTERAVES

PEGOMYIES : Le vol des mouches de la betterave se poursuit depuis une dizaine de jours. Les pontes qui se trouvent à la face inférieure des feuilles donnent actuellement naissance à des larves mineuses en plus ou moins grand nombre selon les régions.

Les dégâts sur betteraves n'ayant que 4 feuilles peuvent devenir importants.

Surveiller attentivement l'apparition des taches claires avec larves entre les deux épidermes et appliquer si nécessaire un traitement avec l'un des produits de la liste de produits conseillés en 1964 par les Stations d'Avertissements.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.